

1. Un collettivo di 60 donne e 40 uomini è stato intervistato circa l'attitudine al fumo. Si sono ottenute le seguenti risposte (1 = fumatore; 0 = non fumatore).
- Uomini 0010001011100001001001100000010000110
010
- Donne 100001001100001001100000100000000101
000000101000001000000010
- a) Ricavare la tabella di distribuzione doppia rispetto al sesso e all'attitudine al fumo
- b) Quale percentuale di uomini fuma? Quale percentuale di donne fuma? Si può concludere che l'attitudine al fumo dipenda dal sesso? Motivare la risposta.
- c) Calcolare un indice opportuno per misurare la dipendenza dell'attitudine al fumo dal carattere sesso e si commenti il risultato.

3. Nel 2000, la distribuzione di una popolazione di famiglie per classi di spesa mensile (in milioni di lire) e per area geografica di residenza è stata la seguente:

Area geografica	Spesa mensile			
	1-3	3-4	4-6	
Nord	346	4173	7403	
Centro	122	1271	3392	
Sud	456	1560	4500	

- a) Si calcoli l'indice di dipendenza in media della spesa mensile dall'area geografica

2. La tabella riporta i risultati della rilevazione congiunta dei fenomeni X = attività fisica e Y = livelli di colesterolo (mg/dl) per una popolazione di 220 studenti:

	Livelli di colesterolo		
	160-200	200-220	220-260
Attività fisica			
Scarsa o nulla	10	40	50
Moderata o elevata	60	40	20

- a) Si calcolino le distribuzioni condizionate di Y alle modalità di X e si concluda se c'è indipendenza tra i due caratteri.
- b) Si calcoli un opportuno indice di dipendenza e si commenti il risultato.

4. Si consideri la seguente tabella che mostra il numero di fusti trasportati in container che sono risultati danneggiati in occasione di impatti a diverse velocità. Si calcoli la correlazione che c'è tra i due caratteri.

Velocità	3	3	3	3	5	5	6	7	7	8
Fusti danneggiati	54	62	65	94	122	84	142	139	184	254